




PROGRAM SZCZEPIEŃ DZIECI I DOROSŁYCH



SZCZEPIONKA PRZECIWKO	GODZINA ŻYCIA	MIESIĄC ŻYCIA								ROK ŻYCIA					LATA ŻYCIA				
	24h ¹	2 ²	3	4	5	6	7	13-15	16-18	6	9	14	18	19 ³	19-26	27-49	50-59	60-64	>65
GRUŹLICY	BCG																		
WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B	HBV	HBV					HBV								HBV 3 dawki (osoby, które nie były wcześniej szczepione)				
ROTAWIRUSOM		RV																	
BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCIOWI		DTP	DTP	DTP				DTP	DTaP		Tdap		Td	Tdap 1 dawka co 10 lat					
POLIOMYELITIS			IPV	IPV				IPV	IPV										
HIB (HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu B)		Hib	Hib	Hib				Hib											
PNEUMOKOKOM		PCV		PCV				PCV									PCV 1 dawka ⁸	PCV 1 dawka ⁹	PCV 1 dawka ¹⁰
ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZE								MMR	MMR					MMR 2 dawki (osoby, które nie chorowały i nie były szczepione)					
OSPIE WIETRZNEJ								VZV ⁴					VZV 2 dawki (osoby, które nie chorowały i nie były szczepione)						
ŁUDZKIEMU WIRUSOWI BRODAWCZAKA											HPV ⁵			HPV 3 dawki	HPV 3 dawki ⁶				
MENINGOKOKOM		MenB i MenACWY												MenB i MenACWY 1 lub 2 dawki					
GRYPIE								IIV					IIV 1 dawka co roku w czasie sezonu infekcyjnego ⁷						
COVID-19								COVID-19					COVID-19 Liczba dawek zależy od historii szczepień i aktualnych zaleceń						
WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU A								HAV					HAV 2 dawki (osoby, które nie były wcześniej szczepione)						
KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU								KZM					KZM 3 dawki + dawki przypominające co 3-5 lat						
PÓŁPAŚCOWI																	RZV 2 dawki w odstępie 2-6 mies.		
SYNCYTIALNEMU WIRUSOWI ODDECHOWEMU (RSV)																	RSV 1 dawka		

¹ Szczepienie przeprowadza się w 1. dobie życia albo nie później niż do dnia wypisu ze szpitala.

² Szczepienia można rozpocząć po ukończeniu przez dziecko 6 tygodni.

³ Td – bezpłatne lub Tdap – odpłatne.

⁴ Szczepienie obowiązkowe (bezpłatne) tylko we wskazanych w PSO grupach ryzyka; szczepionkę można podawać dziecku po ukończeniu 9. m.ż., optymalnie w 12. m.ż.; w pozostałych grupach – płatna.

⁵ Szczepienia bezpłatne po ukończeniu 9 lat do 14 lat oraz refundacja jednej szczepionki w grupie po ukończeniu 9 lat do 18 lat.

⁶ Decyzja o szczepieniu po rozmowie z lekarzem na temat korzyści ze szczepienia.

⁷ Dla osób w wieku ≥60 lat zalecana jest szczepionka wysokodawkowa; w przypadku jej niedostępności lub braku akceptacji przez pacjenta – szczepionka standardowa.

⁸⁻⁹ 1 dawka PCV-13 lub PCV-20.

¹⁰ 1 dawka PCV-13 + PPSV-23 lub 1 dawka PCV-20.